



## Каковы признаки инфузионной реакции?

При внутривенном введении ЛП ТРИБУВИА® следующие признаки указывают на развитие инфузионной реакции: лихорадка, головная боль, озноб или жар, рвота, тошнота, высыпания на коже или зуд, боли и дискомфорт в животе или в грудной клетке, воспаление гортани, слабость, повышение или понижение артериального давления, одышка, учащение или замедление сердцебиений, покраснение, затруднение дыхания, боль в мышцах, головокружение.

Немедленно сообщите лечащему врачу или медсестре, если у Вас возникли какие-либо из перечисленных симптомов в процессе введения или в течение 24 часов после инфузии ЛП ТРИБУВИА®.

Для предотвращения или снижения риска развития инфузионных реакций Вам будут назначены дополнительные лекарственные препараты перед каждым введением ЛП ТРИБУВИА®. От соблюдения режима их приема зависит переносимость инфузии. Часть из дополнительных препаратов необходимо принять самостоятельно в соответствии с рекомендациями врача:

### Препараты, принимаемые вечером накануне инфузии:

1 \_\_\_\_\_  
название, количество/доза

2 \_\_\_\_\_  
название, количество/доза

### Препараты, принимаемые утром в день инфузии:

1 \_\_\_\_\_  
название, количество/доза

2 \_\_\_\_\_  
название, количество/доза

## Каковы признаки заражения инфекцией?

Следующие признаки указывают на возможную инфекцию:

- повышенная температура тела или озноб;
- кашель, который не прекращается;
- герпетические высыпания на губах, гениталиях, опоясывающий герпес;
- общее плохое самочувствие или слабость.

### Что еще я должен сделать?

Если вы наблюдаете один из вышеперечисленных признаков, немедленно сообщите врачу или медсестре. **Не пытайтесь самостоятельно лечить симптомы другими лекарствами.**

В ситуации получения медицинской помощи, сообщите врачу, что получаете ЛП ТРИБУВИА® и покажите данную памятку.

### Что еще я должен знать?

Во время лечения ЛП ТРИБУВИА® нельзя применять некоторые вакцины. При необходимости вакцинации проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. При применении ЛП ТРИБУВИА® теоретически может быть повышен риск развития онкологических заболеваний. До начала и во время терапии необходимо проходить рекомендованные по возрасту и полу обследования (скрининг) для своевременного выявления опухолей.

### Где я могу получить более подробную информацию?

Необходимо ознакомиться с листком-вкладышем ЛП ТРИБУВИА®.

**Убедитесь, что врач предоставил Вам листок-вкладыш до введения ЛП ТРИБУВИА®.**

## Даты введения ЛП и контактная информация

Дата последней инфузии: \_\_\_\_\_

Дата первой инфузии: \_\_\_\_\_

ФИО пациента: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИО врача: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Контактная информация врача: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

К посещению врача подготовьте список всех лекарственных средств, которые вы принимаете в настоящее время.

**Обратитесь к вашему врачу или медсестре, если у вас возникли вопросы по поводу информации в этой карточке-памятке.**

Если у Вас появились нежелательные реакции, связанные с применением ЛП ТРИБУВИА®, сообщите об этом лечащему врачу.

Так же можно передать эту информацию любым удобным способом:

✉ по электронной почте: [safety@biocad.ru](mailto:safety@biocad.ru)

✉ по почте: 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи., 34-А

☎ по факсу с пометкой «фармаконадзор»: 8-812-380-49-33 доб. 8639

☎ по телефону: 8-812-380-49-33

🌐 заполнить онлайн форму на сайте [biocad.ru/farmakonadzor](http://biocad.ru/farmakonadzor)